

**UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
ESCUELA DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE MEDICINA**

**INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
PREVENCIÓN PRIMARIA DEL ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS DE
3 A 5 AÑOS, EN LA CLÍNICA CANTAURA, ANZOÁTEGUI. PRIMER
TRIMESTRE 2010**

**Tutora
Dra. Susana Ornelas**

**Autoras
Chaurant Betzaida
Hernández, Elvira
Maestre, Josefa**

Puerto La Cruz 2010

INTRODUCCIÓN



CAPITULO I EL PROBLEMA

ISAAC , asma y los trastornos de tipo alérgicos relacionados con ella, están aumentando en incidencia y probablemente en severidad

La prevención de ésta enfermedad, que por ser un padecimiento crónico afecta la calidad de vida y el desempeño educativo, social y laboral del niño.

- ❖ Aumento en niños menores de 10 años con problemas de asma bronquial.
- ❖ Las actividades de atención primaria de salud no son ejecutadas.
- ❖ Reingresos frecuentemente con la misma crisis leves a moderado
- ❖ Desconocimiento sobre el asma como enfermedad y sus causas ambientales que desencadena los ataques de asma.



¿Cuáles es la intervención del profesional de enfermería en la prevención primaria del asma bronquial en niños de 3 a 5 años, en la Clínica Cantaura, Anzoátegui. Primer trimestre 2010?

Objetivo General

Determinar las intervenciones del profesional de enfermería en la prevención primaria del asma bronquial en niños de 3 a 5 años, en la Clínica Cantaura, Anzoátegui. Primer trimestre 2010.

Objetivos específicos

Identificar las acciones del profesional de enfermería en la prevención primaria del asma en cuanto al fomento de la salud.

Identificar las acciones del profesional de enfermería en cuanto a protección específica en la prevención del asma en los niños.

Justificación



MARCO TEÓRICO

Mercado, A. Oropeza, N. y Palencia, R. (2007) la capacitación de madre en lo concerniente a la prevención y atención del asma, con la intención de que actúe como unidades de asistencia comunitaria a favor de controlar el asma en niños de 1 a 5 años, en la comunidad de San Valentín, Municipio la Trinidad, Estado Yaracuy.

Martínez, A. (2006), describir las orientaciones de enfermería a padres y representantes sobre la prevención del asma en niños menores de 5 años del Centro Integral de Salud, CIS Tipo III, en Boyacá V, en Barcelona.

Farías, M. Ojeda, Y. y Salazar, M. (2005), determinar la información sobre el asma, que posee las madres de los niños menores de 5 años, hospitalizado en el área de Pediatría, Hospital "Dr. Domingo Luciani".

Bases teóricas

Asma


Según el Proyecto ISAAC_UNICEF (2002) definen la enfermedad del asma como "inflamación crónica de las vías aéreas con episodios recurrentes de síntomas obstrucción bronquial e hiperreactividad de las vías aéreas"

Entre los síntomas más característicos del asma bronquial Istúriz G. (2007) expresa que son "la disnea o dificultad respiratoria de intensidad y duración variable y con la presencia de espasmos bronquiales, habitualmente acompañados de tos, secreciones mucosas y respiración sibilante".



ISAAC_UNICEF (2002) presenta como fundamento en los niveles de control del paciente ya diagnosticado con asma:

- Controlado
- No Controlado
- Parcialmente Controlado





Prevención del asma

❖ Estilo de vida

❖ Alimentación

❖ Desencadenantes ambientales

❖ Los factores psicológicos

Polen

Ascaro

Polvo

Humedad

Alergenos de origen animal domésticos



Polen



Ácaros del polvo



Moho



Caspa animal

ADAM.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

Definición conceptual: acciones encaminadas al conocimiento de variables o factores biopsicosociales que pueden provocar la aparición de la enfermedad del asma.

Definición operacional: Referido a las acciones de enfermería en prevención primaria para lograr medidas específicas a fin de evitar el desencadenamiento de la enfermedad del asma.

DIMENSIÓN	INDICADORES	SUB-INDICADORES	Ítems
Prevención primaria Acciones de enfermería encaminado a prevenir los factores que contribuyen a la aparición del asma y lograr de manera eficaz a mejorar el pronóstico de la enfermedad.	Fomento de la salud Orientación de enfermera sobre el conocimiento de la enfermedad y la atención precoz de lo síntomas, para evitar la enfermedad y lograr mejor estilo de vida.	Asma Epidemiología Síntomas Clasificación Diagnóstico Estilo de vida Alimentación Desencadenantes ambiental	1-2 3-4 5-6-7 8 9 10 11 12
	Protección específica Son acciones destinadas a prevenir los factores desencadenantes del asma en los niños.	Control Ambiental Polen Acaros Mascotas Deshumidificadores Limpieza	13 14 15 16 17- 18-19-20

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de estudio: Descriptivo y de campo

Población y Muestra: En esta investigación la población está conformada por 12 enfermeras que trabajan en la Clínica Cantaura.

Método de instrumento de recolección de datos:

La encuesta mediante la aplicación de un cuestionario, estructurado en escala de Lickert de tres (3) puntos, cuya categoría y valor son: Siempre (3), Alguna Veces (2) y Nunca (1), en total son 20 preguntas.


Validez : por juicios de expertos en el área.

Confiabilidad

**La confiabilidad fue dada según la técnica de ALFA – CRONBACH
 $\alpha = 0,89$**

GRAFICO 1

Distribución de frecuencia sobre el Asma en la intervención del profesional de enfermería en la prevención primaria del asma bronquial en niños de 3 a 5 años, en la Clínica Cantaura, Anzoátegui. Primer trimestre 2010.



CUADRO 3

Distribución de frecuencia sobre los Síntomas del Asma en la intervención del profesional de enfermería en la prevención primaria del asma bronquial en niños de 3 a 5 años, en la Clínica Cantaura, Anzoátegui. Primer trimestre 2010.





GRAFICO 6

Distribución de frecuencia sobre el control ambiental, en la intervención del profesional de enfermería en la prevención primaria del asma bronquial en niños de 3 a 5 años, en la Clínica Cantaura, Anzoátegui. Primer trimestre 2010.



Conclusiones

En cuanto a la Prevención: El 17% de las enfermeras encuestadas siempre realizan acciones para la prevención primaria mediante estrategias que permiten prevenir la presentación de esta enfermedad o su incremento, el 75% algunas veces y el 8% nunca cumple con esta acción

En el Fomento de Salud: El 12 (100%) de las enfermeras siempre orienta a los padres y familia sobre los síntomas principales del asma como la tos, sibilancia y la falta de aliento, disnea.

En la Protección Específica: Un 75% de las enfermeras orientan sobre el estilo de vida saludable, los alimentos que puede desencadenar el asma y la contaminación ambiental. El 25% algunas veces.

Recomendaciones

Promover en las enfermeras la implementación de técnicas participativas con las comunidades, que faciliten evaluar y mejorar el conocimiento de los padres de los niños asmáticos acerca de su enfermedad y su tratamiento preventivo.

Concientizar al personal de enfermería sobre promover, planear y ejecutar actividades educativas continuas y permanentes dirigidas a las madres y familia sobre el reconocimiento de los signos de alarma y factores de riesgos para prevenir la enfermedad.

G R A C I A S

