

# Suplemento especial N° 1- GUIA Práctica y Terapéutica de SARS-COVID-19

*Andrea Bonelli, Maritza Durán Castillo, Elizabeth Hernández Maurice, Héctor Marcano Amador, Virginia Salazar, Elisanny Sánchez, Gustavo Villasmil Prieto.*

Recibido: 1 de Mayo 2022

Aceptado: 6 de Mayo de 2022

## **Editorial**

El propósito de esta guía, a pesar de la abundante bibliografía sobre el tema, es proporcionar al médico en el ejercicio diario de su tarea, una herramienta de uso sencillo que permita un abordaje práctico para la rápida resolución de los problemas más comunes que a menudo se nos presentan en el tratamiento de la COVID-19.

La metodología de algoritmos permite un acceso visual eficiente que hará más efectiva la actuación del médico.

La Sociedad Venezolana de Medicina Interna, consciente de su responsabilidad y sabiendo que somos los médicos internistas los responsables, en buen porcentaje, de la atención de estos pacientes, ha entendido la importancia de proveer a nuestros asociados y a los médicos que viven día a día los problemas de esta terrible enfermedad, de una guía práctica.

Por ello hace entrega de esta contribución en la seguridad de que será un aporte más y sobre todo útil, para la atención de nuestros

enfermos. Esperamos sea de su agrado.

Estas guías serán revisadas periódicamente, de manera de actualizarlas en la medida en que surja la evidencia.

## **Definiciones operativas**

### **Caso sospechoso.**

Persona que cumple los criterios clínicos y epidemiológicos:

Criterios clínicos: aparición súbita de fiebre y tos o aparición súbita de tres o más signos o síntomas de la lista que se detalla a continuación: fiebre, tos, debilidad general/fatiga, cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal, disnea, anorexia/náuseas/vómitos, diarrea, estado mental alterado. Paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre o fiebre medida igual o superior a 38 °C y tos con inicio en los últimos 10 días y que precisen hospitalización).

Criterios epidemiológicos: haber residido o trabajado en una zona de alto riesgo de transmisión del virus: entornos residenciales cerrados o entornos humanitarios como campamentos o estructuras similares para personas desplazada en algún momento del periodo de 14 días anteriores a la aparición de los síntomas o haber residido en una zona en la que haya transmisión comunitaria, haber viajado a ella en algún momento del periodo de 14 días anterior a la