hierba insectívora y semiacuática *Drosera capillaris,* se reconoció una aunque no totalmente similar en la periferia de una de las comunidades de *Eleocharis interstincta*, en una zona de transición con el herbazal de pantano de *Rhynchospora holoschoenoides y R. tenerrina* recubriendo parcialmente la superficie del sustrato bajo una cubierta parcial de *Eleocharis interstincta*, aunque sin la presencia de individuos de la especie *Drosera capillaris*.

Tabla 1. Ubicación, tipo fisionómico, dominancia florística y características del régimen de inundación de las 20 comunidades estudiadas en distintas localidades de lago asfalto de Guanoco.

LOC	UBICACIÓN EN COORDENADAS UTM	TIPO FISIONÓMICO DE VEGETACIÓN	DOMINANCIA FLORISTICA	DRENAJE
1	513.573 E; 1.127.194 N	El sustrato asfáltico domina a la vegetación	Parches aislados de *Cyperus polystachyos* y *Rhynchospora tenerrina.*	Relativamente bien drenado
2	513.573 E; 1.127.194	Matorral medio ralo siempreverde	*Clusia columnaris y Clusia myriandra.*	Bien drenado
3	513.408 E; 1.127.167 N	Herbazal de bajo a medio denso de pantano	*Rhynchospora holoschoenoides* y *R. tenerrina*, con un estrato arbustivo de *Rhynchantera acuminata.*	Mal drenado, periódicamente inundable
4	514.225 E; 1.1127.307 N	Herbazal medio denso de pantano	*Leersia hexandra y Fiurena umbellata*	Mal drenado, permanentemente inundado
5	513.036 E; 1.127.469 N	Herbazal alto denso de pantano	*Typha dominguensis*	Mal drenado, permanentemente inundado
6	1.126.918 N; 514.313 E	Herbazal medio denso de pantano	*Eleocharis interstincta*	Mal drenado, permanentemente inundado
7	1.127.127 N; 514.478 E	Arbustal alto de medio a denso de pantano	*Ludwigia nervosa*	Mal drenado, permanentemente inundado
8	1.127.124 N; 514.462 E	Herbazal medio denso de pantano	*Eleocharis interstincta*	Mal drenado, permanentemente inundado
9	514.425 E; 1.127.750 N	Herbazal medio ralo de pantano con un estrato arbustivo discontínuo	*Rhynchospora holoschoenoides* y *R. tenerrina - Rhynchantera acuminata*	Mal drenado, permanentemente inundado
10	514.473 E; 1.127.132 N	Bosque bajo denso siempreverde	*Inga edulis* y *Mangifera indica*	Periódicamente inundable
11	513.315 E; 1.126.126 N	Herbazal alto denso de pantano	*Leersia hexandra - Fiurena umbellata*	Mal drenado, permanentemente inundado
12	513.781 E; 1.125.842 N	Matorral medio denso de pantano	*Chrysobalanus icaco*	Mal drenado, con el sustrato saturado de agua o cubierto con una lámina de agua poco profunda
13	1.127.305 N; 513.662 E	El sustrato asfáltico domina a la vegetación	Individuos aislados o en grupos de *Clusia columnaris* y *Clusia myriandra*	Bien drenado
14	513614 E; 1127281 N	Matorral de bajo a medio siempreverde	*Clusia columnaris* y *C. myriandra.*	Bien drenado
15	513.618 E;1.127.390 N	Herbazal medio denso de pantano con un estrato arbustivo	*Lagenocarpus guianensis - Rhynchantera acuminata*	Mal drenado, suelos permanentemente saturados o cubiertos por una lámina de agua
16	513.567 E; 1127405 N	Herbazal medio denso de pantano con un estrato arbustivo	*Rhynchospora holoschoenoides* y *R. tenerrina - Rhynchantera acuminata*	Sustrato saturado de agua o con una pequeña lámina de agua
17	513.567 E; 1127405 N	Herbazal medio denso de pantano	*Eleocharis interstincta*	Mal drenado, presencia de una lámina de agua durante gran parte del año
18	1.127.547 N; 513.553 E	Isla arbórea o bosquete bajo denso	*Mangifera indica* e *Inga edulis.*	Inundable por lluvia durante un periodo de tiempo corto
19	1.127.462 N; 513.603 E	Herbazal medio denso de pantano	*Lagenocarpus guianensis*	Mal drenados, suelos permanentemente saturados o cubiertos por una lámina de agua
20	513613 E; 1.127451 N	El sustrato asfáltico con agua aflorante con un alto contenido de azufre domina a la vegetación	Parches de un herbazal bajo de pantano y discontínuo *Eleocharis geniculata*	Mal drenado, con el sustrato saturado permanentemente saturado